РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЭТАПНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГЛУБОКОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

**(Тихилов Р.М., Сивков В.С., Разорёнов В.А.,
Тараненко М.Ю., Сементковский А.В.)**

- **Глубокая инфекция после первичного эндопротезирования**
от 0,3% до 1,5%
- **После ревизионных процедур**
от 1,2% до 2,5%
- **Послеоперационная летальность**
до 2,5%

(Haaker R. et al., 2004;
Hanssen A.D. et al., 2004)

***За период с 2005 года в клинике
РНИИТО им. Р. Р. Вредена пролечено
107 пациентов по поводу глубокой
инфекции после эндопротезирования
тазобедренного сустава***

Тактика лечения пациентов с применением двухэтапной методики

I этап Ревизия:

- тщательная хирургическая обработка раны
- удаление всех компонентов эндопротеза, цемента
- установка спейсера

Парентеральная антибактериальная терапия (3-х недельный курс)

II этап Амбулаторный:

- супрессивная пероральная антибактериальная терапия (6-8 недельный курс)

III этап Реэндопротезирование

- парентеральная антибактериальная терапия (2-х недельный курс)

IV этап Амбулаторный:

- супрессивная пероральная антибактериальная терапия (6 недельный курс)

Результаты первого этапа хирургического лечения

Модификация антимикробного имплантата	кол-во б-ных	после первичного эндопротезирования	после ревизионного эндопротезирования	I тип ППИ	II тип ППИ	III тип ППИ	рецидив
артикулирующий спейсер	73	48	25	23	24	26	10 (13,7%)
блоковидный спейсер	34	18	16	9	7	18	7 (20,6%)
всего	107	66	41	32	31	44	17 (15,9%)

Общие критерии для возможности проведения двухэтапного повторного эндопротезирования

I - II - III типы параэндопротезной инфекции:

- *распространенное поражение окружающих тканей, вне зависимости от стабильности компонентов эндопротеза;*
- *стабильный эндопротез при наличии гр (-) или полирезистентной микробной флоры;*
- *безуспешность ранее производимой попытки сохранения стабильного эндопротеза;*
- *возможность проведения супрессивной антимикробной терапии.*

Основные этапы ревизии

Основные этапы ревизии

Бедренный компонент спейсера тазобедренного сустава

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME20.B05728
Срок действия с 15.08.2007 по 15.08.2010
7531346

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.17ME20
ВНИИМАШ, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ,
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(ОС "Сертиформ ВНИИМАШ")
121007, Москва, ул. Школьная, 4. Тел. 259-35-42, факс 259-33-42, 256-64-33

ПРОДУКЦИЯ
Набор металлических фиксаторов с комплектом инструментов для их установки, изъятия и замены для остеосинтеза костей скелета человека "OSTEOSAB" (см. прил. на 2 л., 50 лез., бланки №№ 1656614, 1656615) ТУ 9437-004-39795719-2006 Серийный выпуск

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 19126-78 (р.2), ГОСТ Р 50444-92 (р.3),
ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89), ГОСТ Р 50582-93
(ИСО 5435-91). Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-09,
Сборника РММ по токсиколого-гигиеническому исследованию полимерных материалов и изделий на их основе медицинскому назначению МЗ РФ, М. 1987

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО НПО "ДЕОСТ", ИНН 5039003073
142390, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская,
ИБП РАН ООО НПО "ДЕОСТ"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО НПО "ДЕОСТ", ИНН 5039003073
142390, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская,
ИБП РАН ООО НПО "ДЕОСТ". Телефон/факс: (4967) 73-57-19

НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний № 620/596-2007 от 01.06.2007 ИЦ «Композит-Тест»
№ РОСС RU.0001.21AЮ48, № 334.007 от 09.03.2007 ИЛЦ НИИ ФХМ МЗ РФ
№ РОСС RU.0001.21ИМ33, сертификатов соответствия системы менеджмента
качества № РОСС RU.ИС39.К00108 от 07.11.2005 ОС СК «ЦССК ИНТЕРКОМС»,
№ TGA-ZM-09-09-00-042-05 от 21.09.2005, рег. удостоверение Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№ ФС 022а2006/3557-06 от 13.07.2006

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Этот сертификат по ГОСТ Р 50460-92 наносит на упаковке рядом с товарным
знаком изготовителя, а также в сопроводительной технической документации,
сериальными номерами

С. М. Масушкина
Л. И. Бероговская

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Способ изготовления вертлужного компонента спейсера

Установленный спейсер тазобедренного сустава

ДВУХЭТАПНОЕ ПОВТОРНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ПЭИ II

I этап

результат I этапа

ДВУХЭТАПНОЕ ПОВТОРНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

II этап

результат II этапа

В случаях рецидива инфекционного процесса после установки артикулирующего спейсера нами применялась методика повторных санирующих операций с заменой спейсера, либо пластика островковыми мышечными лоскутами.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА В СЛУЧАЕ РЕЦИДИВА ИНФЕКЦИИ

I этап

II этап

результат II этапа

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА В СЛУЧАЕ РЕЦИДИВА ИНФЕКЦИИ

ПЭИ I

I этап

Рецидив ПЭИ

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЭНДОПРОТЕЗА

параэндопротезная инфекция I – II – III типа:

- сепсис;
- нестабильность компонентов эндопротеза и отказ больного от реэндопротезирования;
- многократные безуспешные попытки сохранения эндопротеза оперативным путем, включая варианты одно- и двухэтапного эндопротезирования;
- гр(+) полирезистентная и гр(-) микробная флора;
- невозможность последующего проведения операции реэндопротезирования у лиц с тяжелой сопутствующей патологией или полиаллергией к антимикробным препаратам.

ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Двухэтапное эндопротезирование с использованием артикулирующего спейсера является предпочтительной методикой при лечении пациентов с параэндопротезной инфекцией в области тазобедренного сустава

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Купирование инфекционного процесса

86,3%

Сохранение функции оперированного сустава

73,4%

***Применение артикулирующего
спейсера позволяет сохранить
относительную функциональную
пригодность конечности и ее длину,
после ревизионной операции.***

Данная методика оптимизирует проведение последующего этапа резэндопротезирования сустава и положительно сказывается на эмоциональном состоянии пациента, перенёсшего глубокую инфекцию после хирургического вмешательства.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**